

EFFECTO ANTIALIMENTARIO DE LOS EXTRACTOS DE SUSPENSIONES CELULARES DE *Azadirachta indica* SOBRE *Spodoptera frugiperda* J. E. Smith EN CONDICIONES DE LABORATORIO

Jacqueline Capataz Tafur¹; Fernando Orozco Sánchez;²
Rodrigo Vergara Ruiz³ y Rodrigo Hoyos Sánchez⁴

RESUMEN

Los extractos de neem (*Azadirachta indica*) y sus ingredientes activos como la azadiractina, presentan acción antialimentaria e inhibición del desarrollo de muchos insectos. El objetivo de este estudio fue examinar el efecto antialimentario de los extractos de suspensiones celulares de neem elicadas a diferentes condiciones de luz y temperatura. Los extractos fueron aplicados en discos de hojas de maíz y sometidas a bioensayos en larvas de segundo instar de *Spodoptera frugiperda* J. E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae). Los extractos intracelulares y del medio de cultivo de las suspensiones celulares de *A. indica* mostraron efecto biológico sobre larvas de *S. frugiperda* L2, con valores del 100 % de índice antialimentario para los extractos intracelulares de suspensiones de *A. indica* elicadas a 15 °C y oscuridad, y del 39,3% para extractos extracelulares (medio de cultivo) de suspensiones elicadas a 35 °C y oscuridad.

Palabras claves: *Azadirachta indica*, azadiractina luz, temperatura, *Spodoptera frugiperda*.

ABSTRACT

ANTIFEEDANT EFFECT OF CELL SUSPENSION EXTRACTS OF *Azadirachta indica* ON *Spodoptera frugiperda* J. E. Smith UNDER LABORATORY CONDITIONS

Extracts of neem (*Azadirachta indica*) and their active ingredients as azadirachtin, present an action and inhibition of the development of many insects. In this study, the antifeedant effect of cell suspension extracts elicited to different conditions of light and temperature was examined. The extracts were applied in corn leaves disks and submitted to bioassays in larvae of second

¹ Ingeniera Química. Auxiliar de Investigación. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Facultad de Ciencias. A.A. 3840, Medellín, Colombia. <jcapata@unalmed.edu.co>

² Profesor Asistente. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Facultad de Ciencias. A.A. 3840, Medellín, Colombia. <feorozco@unal.edu.co>

³ Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias Agropecuarias. A.A. 1779, Medellín, Colombia. <rvergara@unalmed.edu.co>

⁴ Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias Agropecuarias. A.A. 1779, Medellín, Colombia. <rhoyos@unalmed.edu.co>

Recibido: Junio 20 de 2006; aceptado: Febrero 28 de 2007.

instar of *Spodoptera frugiperda* J. E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae). The intracellular extracts and the culture media (supernatant) of the cell suspensions of *A. indica* showed a biological effect on larvae of *S. frugiperda* L2, with values of the 100 % of antifeeding index for the intracellular extracts of cells elicited to 15 °C and darkness, and 39,3% of antifeeding index for extracellular extracts (medium of cultivation) of elicited suspensions to 35°C, and darkness.

Key words: *Azadirachta indica*, azadirachtin, light, temperature, *Spodoptera frugiperda*.

El "gusano cogollero del maíz" *Spodoptera frugiperda* J. E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae), es una especie polifitófaga nativa del trópico con amplia distribución geográfica, desde Argentina y Chile hasta el sur de Estados Unidos. Prefiere hojas y brotes tiernos, especialmente los cogollos (Sosa 2002). Entre los cultivos atacados se encuentran arroz, maíz, algodón, sorgo, trigo, avena, caña de azúcar, pastos, ajonjolí, soya, tabaco, plantas hortícolas, ciprés, papa, berenjena, crisantemo, y muchas más (Gallego 1946, Vélez 1997). Es la plaga de mayor importancia económica en muchos cultivos de Colombia, que muestra mayor preferencia por el cultivo del maíz, actuando como gusano tierrero trozador de plántulas, perforador de fruto y como cogollero que es su hábito más característico (Negrete y Morales 2003), alcanzando poblaciones tan altas que pueden causar daños con un índice del 10% de plantas trozadas (García1996).

La aplicación de insecticidas contra el estado larval del gusano cogollero es el principal método de control, pero la alta tolerancia a la mayoría de insecticidas y problemas ambientales asociados pueden comprometer su uso continuado (Greenberg, Showler y Liu 2005). Los productos botánicos son herramientas alternativas útiles y deseables en la mayoría de los programas de manejo de

plagas porque pueden ser eficaces y complementar a menudo las acciones de los enemigos naturales (Schmutterer 1990).

Los extractos del neem (*Azadirachta indica* A. Juss, familia Meliaceae) son ampliamente explotados para su uso contra una amplia variedad de insectos. En particular el triterpeno azadiractina y sus derivados, presentan efecto antialimentario, repelente, insecticida, regulador del crecimiento y son causantes de esterilidad en hembras adultas (Allan *et al.* 2002, Schmutterer 1990). Sin embargo, su compleja estructura química hace difícil su producción comercial mediante síntesis química. Así, el suministro de insecticidas elaborados a partir de neem depende de la extracción de las semillas, las cuales son difíciles de obtener en la cantidad y calidad necesarias para asegurar el alto contenido de azadiractina. Las técnicas del cultivo de tejidos vegetales *in vitro* y de suspensiones celulares de neem, han sido desarrolladas y estudiadas como métodos alternativos para la síntesis del producto (Zounos, Allan y Mordue 1999).

El objetivo de este estudio fue el de investigar y determinar la capacidad de las suspensiones celulares de *A. indica* para la producción de azadiractina

sometidas a condiciones de elicitación de régimen de luz y temperatura. Para esto se realizó el análisis químico de los extractos de las suspensiones y se evaluó su actividad biológica mediante bioensayos de escogencia en larvas de segundo instar de *S. frugiperda*.

MATERIALES Y MÉTODOS

Suspensiones celulares de *A. indica*. Las suspensiones fueron iniciadas a partir de callos friables de ocho (8) semanas de edad provenientes de explantes de hojas juveniles, suministrados por el Laboratorio de Crecimiento y Desarrollo de las Plantas (Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín). 500 mg de callos friables fueron transferidos en forma aséptica a erlenmeyers de 250 mL con 50 mL del mismo medio utilizado para la inducción de los callos pero sin agente gelificante. El medio de cultivo consistió de sales básicas Murashige & Skoog 962, con orgánicos mínimos (MSMO, Sigma M6899), suplementado con 4 mg/L de ácido indol butírico (IBA), 1 mg/L de 6-benzil amino purina (BAP) y 3 % (p/v) de sacarosa, ajustado a un pH de 5,8 (Kearney *et al.* 1994). Los cultivos fueron incubados en un agitador orbital a 25 °C ± 1 °C y 120 rpm en condiciones de oscuridad. El subcultivo fue realizado cada 21 días en el mismo medio descrito anteriormente.

Diseño experimental. Se adoptó un diseño experimental multinivel factorial 3 x 2 completamente al azar para estudiar los efectos de temperatura (15 °C y 35 °C) y del régimen de luz (luz continua, 12 h luz / 12 h oscuridad y oscuridad completa) en las suspensiones de *A.*

indica. Los experimentos fueron realizados en enlemenyer de 100 mL con 20 mL de medio de cultivo y utilizando un inóculo del 20 % v/v a 120 rpm durante 15 días. Se tomaron muestras cada tercer día para evaluar el crecimiento celular (datos no mostrados) y el efecto antialimentario de los extractos intra y extracelulares del cultivo. El efecto de los diferentes tratamientos se analizó estadísticamente mediante análisis de varianza (ANAVA). Los experimentos fueron realizados por duplicado.

Obtención de los extractos intra y extracelulares de la suspensiones de *A. indica*. La extracción de los metabolitos intra y extracelulares de los cultivos de *A. indica* en medio líquido se realizó con disolventes orgánicos polares a partir de la biomasa celular y del medio de cultivo (sobrenadante), los cuales fueron separados mediante filtración al vacío. Para la obtención de los extractos intracelulares, 5 g de biomasa seca fue macerada y extraída con metanol, CH₃OH (3 x 10 mL); los extractos fueron combinados y concentrados al vacío en un rotoevaporador R-3000 Büchi por debajo de 45 °C hasta sequedad; se adicionaron 10 mL de agua destilada más 1 mL de cloruro de sodio (NaCl 5 % p/v) y se extrajo con diclorometano, CH₂Cl₂ (3 x 10 mL).

Las fases acuosas fueron descartadas y las capas de diclorometano se combinaron y se secaron con sulfato de magnesio (MgSO₄) para retirar el exceso de agua. Los extractos intracelulares se rotoevaporaron nuevamente hasta sequedad y fueron redissueltos en 2 mL de metanol HPLC y almacenados a -4 °C (Balaji *et al.* 2003, Dai *et al.* 1999,

Giraldo *et al.* 2002, Mordüe y Blackwell 1993, Schaaf *et al.* 2000).

El volumen del medio de cultivo libre de células fue medido y una parte de medio fue mezclado con 0,25 partes de diclorometano en un embudo de separación y agitado por un minuto. Después la fase de diclorometano fue removida. Este procedimiento se realizó 3 veces y todas las fracciones de diclorometano fueron combinadas y el exceso de agua fue removido utilizando $MgSO_4$ el cual fue retirado por filtración. Los extractos extracelulares fueron rotoevaporados al vacío por debajo de 45°C y resuspendidos en 2 mL de metanol HPLC y almacenados a -4 °C (Mordüe y Blackwell, 1993).

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Los extractos fueron analizados en una columna Supelcosil LC-18 RP-HPLC (10 cm. x 4,6 mm D.I, diámetro de poro 5 mm, Merck, Alemania). Se utilizó como fase móvil acetonitrilo-agua (40:60) a una velocidad de flujo de 0,7-mL min^{-1} , inyectando 10 μL de cada solución estándar de azadiractina y de los extractos. La cuantificación de azadiractina fue realizada a 218 nm utilizando un detector de arreglo de diodos UV visible Agilent G1315B (Giraldo *et al.* 2002, Schaaf *et al.* 2000).

Insectos. Para los bioensayos, las larvas de *S. frugiperda* fueron suministradas por el Laboratorio de Control Biológico de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, las cuales fueron alimentadas con hojas de maíz (*Zea mays*). Las larvas fueron mantenidas a 27 ± 2 °C, condiciones de fotoperíodo de 12 h : 12 h – luz : oscuridad y 65 % humedad relativa promedio.

Bioensayos de escogencia. Las evaluaciones de los extractos intra y extracelulares se realizaron de acuerdo con la metodología reportada por Blaney *et al.* 1990. Se utilizaron larvas de *S. frugiperda* de segundo instar (L2) las cuales fueron dejadas sin alimentación durante 3 horas antes del bioensayo. Luego se colocaron individualmente dentro de cajas de Petri de 8,5 cm. de diámetro con una capa de agar 1,0 % p/v, en la que habían dos discos de hojas de maíz con un área de 2,25 cm^2 . Uno de los discos no fue inoculado con los extractos, actuando como control y el disco del tratamiento recibió 50 μL de los extractos. Previamente se evaluó el efecto del disolvente para descartar su efecto en la alimentación de los insectos y de 50 μL de azadiractina 1,5 ppm en metanol como control positivo de los ensayos. El efecto antialimentario de los bioactivos (E.A.A) se calculó mediante la fórmula propuesta por Kearney *et al.* 1994 y Blaney *et al.* 1990.

$$E.A.A = \frac{\text{Área del disco control consumida} - \text{Área del disco con tratamiento consumida}}{\text{Área del disco control consumida} + \text{Área del disco con tratamiento consumida}} \times 100$$

Los bioensayos fueron finalizados a las 24 h. El área consumida fue cuantificada

con un medidor de área foliar LI-3000A Portable Leaf Area Meter (Li-Cor, USA),

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto antialimentario de los extractos intra y extracelulares a condiciones de 25 °C y oscuridad (control). El efecto antialimentario producido por los extractos es altamente variable en las distintas especies de plagas; aún para aquéllas donde la supresión de la alimentación aparece como una contribución principal para la protección de los cultivos, la respuesta puede ser alcanzada a partir del efecto tóxico postingestivo en vez de un comportamiento directo (Isman 2002). En el caso de larvas de *S. frugiperda* L2, los bioensayos realizados con extractos intracelulares de *A. indica* cultivados a 25 °C y oscuridad, mostraron un alto porcentaje de efecto antialimentario (Figura 1), sugiriendo que compuestos

antialimentarios son producidos durante el crecimiento celular. Entre el día 3 se obtuvo un E.A.A del 70 % incrementándose hasta 99 % el día 15 de cultivo. Mordüe y Blackwell 1993, reportaron que el efecto antialimentario de extractos etanólicos de suspensiones celulares de *A. indica* cultivadas a 25 °C y oscuridad, en ninfas de *S. gregaria* se incrementó significativamente entre los días 7 y 10 de 26,7 % a 55,1 %. Extractos de líneas celulares de callos y de suspensiones celulares de *A. indica* presentaron un alto E.A.A sobre *Schistocerca gregaria*, utilizando el mismo medio de cultivo de esta investigación (Kearney *et al.* 1994). En su estudio, el E.A.A de los extractos de las suspensiones celulares de *A. indica* se incrementó significativamente entre los días 14 y 24 del cultivo.




Figura 1. Índice antialimentario de los extractos celulares de *Azadirachta indica* a 25°C oscuridad, sobre larvas de *Spodoptera frugiperda*.

En este estudio, los extractos de los días 9 y 12 de incubación obtenidos del medio de cultivo, mostraron un efecto sobre las larvas de *S. frugiperda* (Figura 2), a pesar de las pequeñas concentraciones de azadiractina detectada (0,03 mg/L –

0,56 mg/L) y alcanzándose un máximo de 35 % de dicho efecto en el día 9. Los extractos extracelulares obtenidos por Mordüe y Blackwell 1993, tuvieron efecto un efecto antialimentario en ninfas de *S. gregaria* incrementándose 20

veces entre los días 5 y 10 del cultivo. En esta investigación se observó un incre-

mento en el E.A.A entre los días 6 y 9 de cultivo.




Figura 2. Índice antialimentario del medio de cultivo de *Azadirachta indica* a 25°C y oscuridad, sobre larvas de *Spódoptera frugiperda*.

Efecto antialimentario de los extractos intra y extracelulares de suspensiones de *A. indica* obtenidos bajo diferentes condiciones de luz y temperatura. Los extractos intra y extra celulares de las suspensiones de *A. indica* bajo las condiciones de elicitación abiótica fueron evaluados en larvas de *S. frugiperda* L2 (Figura 3). La evaluación antialimentaria de los extractos se realizó después de haber transcurrido una hora de ser aplicado el extracto. El efecto observado varió en los tratamientos, desde una alta preferencia de los lepidópteros a aposentarse sobre los discos de hojas control hasta un total rechazo de los discos con extractos. En general, el efecto repelente prevaleció durante todo el ensayo aunque en algunos casos se notó una mayor ingesta al comienzo de los bioensayos disminuyendo hacia el final del experimento, a pesar de que sólo se realizó una aplicación del extracto

previo a la exposición de las larvas al material.

Los extractos intracelulares de las suspensiones de *A. indica* bajo los efectos de luz y temperatura mostraron un alto porcentaje de E.A.A en larvas de segundo instar (L2) de *S. frugiperda*, alcanzándose un valor del 100 % con extractos obtenidos a condiciones de 15 °C - oscuridad en el día 9 de cultivo (Figura 4). En este mismo día de cultivo, los tratamientos de 15 °C - luz continua, 25 °C - oscuridad, 35 °C - luz continua y 35 °C - oscuridad obtuvieron valores de 99,1; 93,0; 98,6 y 99,1 % de E.A.A respectivamente. Las suspensiones celulares de *A. indica* presentaron un contenido intracelular de azadiractina entre 0,15 mg/l - 27,31 mg/l; con valores promedio de 4,99 mg/l de azadiractina a 15 °C, 1,64 mg/l a 35 °C y de 4,25 mg/l y 3,58 mg/l de azadiractina a condiciones de oscuridad total y luz continua respectivamente.




Figura 3. Respuesta antialimentaria de los extractos de *Azadirachta indica* en larvas de *Spodoptera frugiperda* L2, **a.** Control azadirachtina grado reactivo (1.5 ppm). **b.** Control hoja de maíz sin extracto **c.** Biomasa a 15 °C - oscuridad, día 9. **d.** Medio de cultivo a 35°C - oscuridad, día 6. **e.** Biomasa a 35°C - fotoperíodo, día 6. **f.** Medio de cultivo a 15 °C - oscuridad, día 6. C: control y T: tratamiento.

Los extractos extracelulares de *A. indica* (Figura 5) exhibieron un E.A.A < 40 % sobre larvas de *S. frugiperda*, a pesar de que se detectó poca cantidad de azadiractina en el medio de cultivo (0,02 mg/l –

5,28 mg/l de azadiractina). Por lo tanto, el efecto antialimentario encontrado se podría atribuir a la presencia de otros compuestos que actúan en forma independiente o sinérgica con la aza-

diractina tales como nimbina, 3-tigloilazadiractina, salanina y otros, de los cuales también se ha reportado que producen efectos antialimentarios (Simmonds *et al.*, 2004). A 15 °C - oscuridad el E.A.A de estos extractos no

superó al 7% y los tratamientos que produjeron mayores compuestos antialimentarios extracelulares fueron 15 °C - luz continua, 15 °C - fotoperiodo, 35 °C - fotoperiodo y 35 °C - oscuridad con valores de E.A.A mayores al 35 %.




Figura 4. Efecto antialimentario de los extractos de las células de *Azadirachta indica*. a. 15 °C; b. 35 °C, sobre larvas de *Spodoptera frugiperda*.




Figura 5. Efecto antialimentario de los extractos del medio de cultivo de *Azadirachta indica*. a. 15 °C; b. 35 °C, sobre larvas de *Spodoptera frugiperda*.

El análisis de varianza (Tabla 1) indica que la interacción luz – temperatura (valor p = 0,4458) no tiene un efecto significativo sobre el índice antialimentario de los extractos de *A. indica*. Por el contrario, la temperatura y la luz son significativas ejerciendo efectos negativos. Los valores óptimos del índice antialimentario se obtuvieron mediante un gráfico de superficie de respuesta estimada, los cuales fueron

15 °C y oscuridad (Figura 6). El comportamiento del E.A.A máximo se puede describir mediante la siguiente ecuación:

$$E.A.A._{m\acute{a}x} = 102,88 - 0,0516083 L - 0,19861 T + 0,000895417 LT$$

E.A.A._{máx}: Índice Atialimentario Máximo (%)
 L: Régimen de Luz (h)
 T: Temperatura (°C)

Tabla 1. Análisis de varianza del efecto antialimentario de los extractos de *Azadirachta indica* sobre larvas de *Spodoptera frugiperda*.

Factor	GL	Suma de cuadrados	Media de cuadrados	Relación F	Valor P
A: Régimen de Luz	1	0,983784	0,983784	7,09	0,0374
B: Temperatura	1	42,3519	42,3519	305,08	0,0000
AB	1	0,092364	0,092364	0,67	0,4458
Error Total	6	0,832923	0,138821		




Figura 6. Superficie de respuesta estimada para el efecto antialimentario máximo de azadiractina de las suspensiones celulares de *Azadirachta indica*.

Las hojas de maíz tratadas con extracto de neem fueron ingeridas por las larvas de *S. frugiperda* hasta llegar a cierto punto de ingestión donde empezaron a comer cada vez menos, hasta que dejaron de ingerir y murieron. Esto significa que la reducción en la toma de alimento por las larvas no es solo gustativa (regulada por los órganos sensoriales de las partes de la boca) sino también no gustativa (Schmutterer 1990).

Blaney *et al.* 1990, reportaron que bioensayos realizados con azadiractina

pura a 1 ppm en larvas de *S. frugiperda* mostraron un 90 % de E.A.A en ensayos de escogencia y un consumo del 5 % del disco tratado en ensayo de no escogencia mostrando una alta susceptibilidad al metabolito. Simmonds *et al.* 2004 reportaron que una concentración de $3,6 \times 10^{-7}$ M de azadiractina es suficiente para causar un 50 % de efecto antialimentario en larvas L3 de *S. frugiperda*. En el presente estudio, la azadiractina aplicada tuvo un E.A.A. de 100 %. En las condiciones de temperatura y régimen de luz estudiados, el efecto antialimentario en larvas de

Spodoptera fue mayor con los extractos celulares de *A. indica* que los extractos del medio de cultivo libre de células. El 13 % de la azadiractina producida fue excretada al medio de cultivo, confirmando esto que la mayor producción de azadiractina es a nivel intracelular y que la actividad antialimentaria de los extractos extracelulares puede ser debida a la presencia de otros metabolitos como 3-tigloilazadiractina y 3-acetil-1-tigloilazadiractina que son compuestos resultantes del rearreglo de la azadiractina (Ley *et al.* 1989) y que pudieron haberse formado a partir de la azadiractina antes de ser secretados al medio.

CONCLUSIONES

Los extractos intra y extracelulares de las suspensiones de *A. indica* elicidas bajo régimen de luz y temperatura tuvieron un alto efecto antialimentario sobre las larvas de *S. frugiperda*, alcanzándose un 100 % de E.A.A. para los extractos intracelulares producidos a 15 °C y oscuridad. Esto indica el potencial de las suspensiones celulares como una herramienta biotecnológica para la producción de productos con efecto antialimentario sobre lepidópteros.

PERSPECTIVAS

Para investigaciones futuras sería importante analizar la robustez del efecto antialimentario de los extractos mediante bioensayos de no escogencia y su efecto en la inhibición del crecimiento en larvas de *S. frugiperda* así como la dosis letal mínima LC₅₀ para asegurar el potencial comercial de las

suspensiones celulares de *A. indica* generadoras de metabolitos.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Dirección de Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, DIME, por el financiamiento de este proyecto Código 030802664 y al Laboratorio de Control Biológico, de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, por el suministro de los insectos para los bioensayos.

BIBLIOGRAFÍA

- Allan, E. J.; Easwara, J. P.; Mordue, A. J.; Mogan, E. D. and Stuchbury, T. 1994. The production of azadirachtin by in vitro tissue culture of neem, *Azadirachta indica*. En: Pesticide Science. Vol. 42; p. 147-152.
- Allan, E. J.; Eeswara, J. P.; Jarvis, A.; Mordue (Luntz), A.; Morgan, E. and Stuchbury, T. 2002. Induction of hairy root cultures of *Azadirachta indica* A. Juss and their production of azadirachtin and other important insect bioactive meta-bolites. Plant Cell Reports. Vol. 21, no. 4; p. 374-379.
- Balaji, K.; Veeresham, C.; Srisilam, K. and Kokate, C. 2003. Azadirachtin, a novel biopesticide from cell cultures of *Azadirachta indica*. En: Journal of Plant Biotechnology -Daejeon-. Vol 5, no. 2; p. 121-129.
- Blaney, W. M.; Simmonds, M. S. J.; Ley, S. V.; Anderson, J. C. and Toogood, P. L.

1990. Antifeedant effects of azadirachtin and structurally related compounds on lepidopterous larvae. En: *Entomologia Experimentalis et Applicata*. Vol. 55, no. 2; p. 149-160.
- Dai, J.; Yaylayan, V. A.; Raghavan, G. S. and Parè, J. R. 1999. Extraction and colorimetric determination of azadirachtin-related limonoids in neem seed kernel. En: *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. Vol. 47, no. 9; p. 59-63.
- Ermel, K.; Pahlich, E. and Schmutterer, H. 1984. Comparison of neem seeds from ecotypes of Asian and African origin. p. 91-94. En: *Proceedings of the 2nd International Neem Conference*. (1984: Ravischholzhausen, Federal Republic of Germany). Germany: German Agency for Technical Cooperation Eschborn.
- Gallego, F. L. 1946. Plagas del maíz *Laphygma frugiperda* S. and A.: Estudio fundamental No. 5. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 60 p.
- García, F. 1996. Integración de métodos para el manejo de *Spodoptera frugiperda* (J. E. Smith). En: *Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en Maíz y Sorgo*. Palmira: Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 171 p. (Boletín Sanidad Vegetal, no. 13).
- Giraldo, F.; Cataño, C.; Morales, G.; López, C. y Galeano, E. 2002. Determinación de azadirachtina por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) en semillas de árbol de neem (*A. indica*) cultivados en Colombia. En: *Vitae*. Vol 9, no. 1; p. 59-63.
- Greenberg, S. M.; Showler, A. T. and Liu, T. X. 2005. Effects of neem-based insecticides on beet armyworm (Lepidoptera: Noctuidae). En: *Insect Science*. Vol.12, no. 1; p. 17-23.
- Isman, M. B. 2002. Insect antifeedants. En: *Pesticide Outlook*. Vol. 13, no. 4; p. 152-157.
- Kearney, M. L.; Allan, E. J.; Hooker, J. E. and Mordue (Luntz), J. 1994. Anti-feedant effects of *in vitro* culture extracts of neem tree, *Azadirachta indica* against the desert locust (*Schistocerca gregaria* Fosskal). En: *Plant Cell Tissue and Organ Culture*. Vol. 37; p. 67-71.
- Ley, S. V.; Anderson, J. C.; Blaney, W. M.; Jones, P. S, Lidert, Z., David Morgan, E.; Robinson, N. G.; Santafianos, D.; Simmonds, M. S. J. and Toogood, P. L. 1989. Insect antifeedant from *Azadirachta indica*. Part V. Chemical modification and structure-activity relationship of azadirachtin and some related limonoids. En: *Tetrahedron*. Vol. 45, no. 16; p. 5175-5192.
- Mordue (Luntz), A. J. and Blackwell, A. 1993. Azadirachtin: An Update.. En: *Journal of Insect Physiology*. Vol. 39, no. 11. p. 903-942.
- Murashige, T. and Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiologia Plantarum*. Vol. 15; p. 473-497.
- Negrete, F. y Morales, J. 2003. Manejo del gusano cogollero del maíz utilizando extractos de plantas. Disponible en Internet. <http://www.turipana.org.co/>

- InvestAgricola.php?pageNum_rsAgricola=7&buscar=/gusano_cogollero.html. [Consultada: 9 Dic. 2006].
- Sosa, M. A. 2002. Daño producido por *Spodoptera frugiperda* J. E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) sobre el rendimiento del cultivo de maíz en siembra directa, según tiempos de exposición a la plaga. Provincia de Santa Fé, Argentina: INTA, Centro Regional Santa Fé. p. 39–45. (Información para Extensión, no. 70).
- Schaaf, O; Jarvis, A. P.; van der Esch, S. A.; Giagnacovo, G. and Oldham, N. J. 2000. Rapid and sensitive analysis of azadirachtin and related triterpenoids from neem (*Azadirachta indica*) by high performance liquid chromatography atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry. En: Journal of Chromatography A. Vol. 886, no. 1-2; p. 89-97.
- Schmutterer, H. 1990. Properties and potential of natural pesticides from the neem tree. En: Annual Review of Entomology. Vol 35; p. 271-298.
- Simmonds, M. S. J.; Jarvis, A. P.; Johnson, S.; Jones, G. R.; and Morgan, E. D. 2004. Comparison of antifeedant and insecticidal activity of nimbin and salannin photooxidation products with neem (*Azadirachta indica*) limonoids. En: Pest Management Science. Vol. 60, no. 5; p. 459–464.
- Vélez, R. 1997. Plagas agrícolas de impacto económico en Colombia: biología y manejo integrado. Medellín Universidad de Antioquia. 428 p.
- Zounos, A. K. Allan, E. J.; and Mordue (Luntz), A. J. 1999. Bioactive compounds from neem tissue cultures and screening against insects. En: Pesticide-Science. Vol. 55, no. 4; p. 486-503.