

ALGUNAS GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS DEL JARDIN AGROSTOLOGICO

Nombre vulgar	Nombre científico	Métodos de siembra
Alemán	<u>Echinochloa polystachya</u>	Tallos de 0,50 cm en cuadro.
Angleton	<u>Dichantium aristatum</u>	Cepas a 0,30 cm en cuadro.
Buffel	<u>Cenchrus ciliaris</u>	Cepas a 0,50 cm en cuadro.
Clavel	<u>Hemarthria altissima</u>	Estolones a chorro continuo surcos a 0,60 cm.
Caña forrajera	<u>Saccharum officinarum</u>	Tallos, chorro continuo surcos a 1 metro.
Carimagua 1	<u>Andropogon gayanus</u>	Cepas a 1 metro en cuadro.
Elefante (King grass)	<u>Pennisetum purpureum</u> por <u>Pennisetum tiphoides</u>	Tallos, chorro continuo, surcos a 1 metro.
Estrella africana	<u>Cynodon nlemfuensis</u>	Estolones chorro continuo, surco a 0,50 cm.
Gleicer	<u>Gliceria maxima</u>	Cariopside chorro continuo surcos a 1 metro.
Guinea	<u>Panicum maximum</u>	Cepas a 0,50 cm en cuadro.
Imperial Var 60	<u>Axonopus scoparius</u>	Tallos chorro continuo surcos a 0,50 cm

Nombre vulgar	Nombre científico	Métodos de siembra
Kikuyo amazónico*	<u>Brachiaria humidicola</u>	Cepas a 0,50 cm en cuadro.
Micay	<u>Axonopus micay</u>	Cepas a 0,50 cm en cuadro.
Pasto peludo*	<u>Brachiaria decumbens</u>	Cepas a 0,60 cm en cuadro
Rhodes	<u>Chloris gayana</u>	Cepas a 0,50 cm en cuadro.
Sorgo forrajero	<u>Sorghum vulgare</u>	Cariopside a chorro continuo, surco a 1 metro.
Acacia forrajera	<u>Leucaena leucocephala</u>	A 2 metros entre plantas
Bejuco de chivo	<u>Centrosema sp.</u>	Surcos a 0,50 cm el caballón.
Rabo Iguana	<u>Calopogonium mucunoides</u>	Surcos a 0,60 cm el caballón.
Campanita azul	<u>Clitoria ternatea</u>	Surcos a 0,60 cm el caballón.
Jacinto	<u>Lablab atropopureum</u>	Surcos a 0,60 cm el caballón
Guandul	<u>Cajanus cajan</u>	Surcos a 0,90 cm en cuadro.
Kudzu	<u>Pueraria phaseoloides</u>	Surcos a 0,90 cm en cuadro.

* Brachiaria decumbens y Brachiaria humidicola

Nombre vulgar	Nombre científico	Métodos de siembra
Terciopelo	<u>Stizolobium deeringianum</u>	Surcos a 0,90 cm en cuadro.
Soya perenne	<u>Glycine wightii</u>	Surcos a 0,40 cm en caballón

Nota: En leguminosas se deben colocar de 3 a 5 semillas por sitio cada 60 cm en el caballón.